

HIDROXICLOROQUINA Y CORONAVIRUS.

En el artículo anterior aclaramos que es antimalárico.

Se expende como Plaquenil, Axemal, Dolquine, Llinol y Quensyl.

Actualmente se utilizan además en el tratamiento de la Artritis Reumatoidea (inflamación de las articulaciones) y el Lupus Eritematoso que es una enfermedad en la que el cuerpo se ataca a él mismo (autoinmune).

Este medicamento se da en forma de tabletas dependiendo de la enfermedad.

Precauciones.

- . Alergia.
- . Problemas de Hígado o sanguíneos.
- . Cambios de visión durante la toma.
- . Interacción con otros medicamentos
- . Embarazo.

Efectos secundarios.

- . Trastornos de lectura.
- . Sensibilidad a la luz.
- . Visión borrosa
- . Dificultades Auditivas.
- . Zumbidos en los oídos.
- . Debilidad muscular.
- . Moretones en la piel.
- . Decoloración o pérdida de cabello.
- . Arritmias Cardíacas.
- . Somnolencia.
- . Convulsiones..

Como pueden observar hay una gran cantidad de efectos secundarios y precauciones de allí que la utilización en otras afecciones es algo muy delicado.

Debido al hecho que por observaciones médicas a consecuencia de la Pandemia del Coronavirus, se ha observado que tiene cierto efecto sobre la enfermedad se está considerando utilizarla en los protocolos de tratamiento .

Un tratamiento sobre el que se ha publicado recientemente un estudio de su efecto sobre 26 pacientes en distintos estados de gravedad, ha traído una gran esperanza a la población mundial. El 70 % de los mismos ha evidenciado cura virológica .

Sin embargo aunque todavía no está aclarada científicamente la relación con la mejoría clínica tenemos que comenzar a considerar los efectos auditivos secundarios a los que puede llevar su uso.

Dr. Guillermo Ernesto Rodríguez.

Médico Asesor.

IPHE.